

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34

106 79 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 3616532 - 2103617784 - Fax: 210 3641025

e-mail : info@hms.gr

www.hms.gr



GREEK MATHEMATICAL SOCIETY

34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street

GR. 106 79 - Athens - HELLAS

Tel. 210 3616532 - 2103617784 - Fax: 210 3641025

e-mail : info@hms.gr

www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

72^{ος} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

“Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Α' τάξη Λυκείου

Πρόβλημα 1

Να βρείτε το υποσύνολο των πραγματικών αριθμών στο οποίο συναληθεύουν οι ανισώσεις:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{|x|-1}{3} \leq \frac{|x|+x^2}{4} \quad \text{και} \quad \frac{x+1}{2} + \frac{x(x+1)}{4} > \frac{(x+2)^2}{4}.$$

Λύση

Έχουμε

$$\frac{x^2}{4} + \frac{|x|-1}{3} \leq \frac{|x|+x^2}{4} \Leftrightarrow 3x^2 + 4(|x|-1) \leq 3|x| + 3x^2 \Leftrightarrow |x| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4.$$

$$\frac{x+1}{2} + \frac{x(x+1)}{4} > \frac{(x+2)^2}{4} \Leftrightarrow 2x+2+x(x+1) > (x+2)^2 \Leftrightarrow -x > 2 \Leftrightarrow x < -2.$$

Επομένως, οι δύο ανισώσεις συναληθεύουν στο διάστημα $[-4, -2) = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x < -2\}$.

Πρόβλημα 2

Να προσδιορίσετε τις λύσεις της εξίσωσης

$$\frac{x+x^2}{1-x^2} \cdot \frac{[(1+ax)^2 - (a+x)^2]}{1-a^2} = \frac{ab}{(a-b)^2},$$

για τις διάφορες τιμές των πραγματικών αριθμών a, b με $ab(a-b)(1-a^2) \neq 0$.

Λύση

Για να ορίζονται οι δεδομένες παραστάσεις πρέπει να ισχύουν:

$$1-x^2 \neq 0, 1-a^2 \neq 0 \text{ (υπόθεση)} \quad \text{και} \quad a \neq b \text{ (υπόθεση)} \Leftrightarrow x \neq \pm 1.$$

Για $x \neq \pm 1$, η δεδομένη εξίσωση είναι ισοδύναμη με την εξίσωση:

$$\frac{x}{1-x} \cdot \frac{(1+a^2x^2 - a^2 - x^2)}{(1-a^2)} = \frac{ab}{(a-b)^2} \Leftrightarrow \frac{x}{1-x} \cdot \frac{(1-a^2)(1-x^2)}{(1-a^2)} = \frac{ab}{(a-b)^2}$$

$$\Leftrightarrow x(1+x) = \frac{ab}{(a-b)^2} \Leftrightarrow (a-b)^2 x^2 + (a-b)^2 x - ab = 0$$

Επειδή είναι $a \neq b$ η τελευταία εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού και έχει διακρίνουσα

$$\Delta = (a-b)^4 + 4ab(a-b)^2 = (a-b)^2 [(a-b)^2 + 4ab] = (a-b)^2 (a+b)^2 = (a^2 - b^2)^2 > 0.$$

Άρα η εξίσωση έχει τις ρίζες

$$x_1 = \frac{-(a-b)^2 + (a^2 - b^2)}{2(a-b)^2} = \frac{2ab - 2b^2}{2(a-b)^2} = \frac{2b(a-b)}{2(a-b)^2} = \frac{b}{a-b} \text{ και}$$

$$x_2 = \frac{-(a-b)^2 - (a^2 - b^2)}{2(a-b)^2} = \frac{2ab - 2a^2}{2(a-b)^2} = \frac{-2a(a-b)}{2(a-b)^2} = \frac{-a}{a-b}.$$

Παρατηρούμε ότι:

$$\frac{b}{b-a} = 1 \Leftrightarrow b = b - a \Leftrightarrow a = 0 \text{ και } \frac{b}{b-a} = -1 \Leftrightarrow b = -b + a \Leftrightarrow a = 2b,$$

$$\frac{-a}{a-b} = 1 \Leftrightarrow -a = a - b \Leftrightarrow 2a = b \text{ και } \frac{-a}{a-b} = -1 \Leftrightarrow -a = b - a \Leftrightarrow b = 0.$$

Επομένως, για τιμές των παραμέτρων a, b που ικανοποιούν τις υποθέσεις $a \neq 0, b \neq 0, a \neq b$ και $a \neq \pm 1$, έχουμε:

- Αν $(a-2b)(2a-b) \neq 0$, η εξίσωση έχει δύο ρίζες

$$x_1 = \frac{b}{a-b} \text{ και } x_2 = \frac{-a}{a-b}.$$

- Αν $a = 2b$, τότε η εξίσωση έχει μόνο τη ρίζα $x_2 = -2$.
- Αν $a = \frac{b}{2}$, τότε η εξίσωση έχει μόνο τη ρίζα $x_2 = -2$.

Πρόβλημα 3

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} = 90^\circ$ και $\hat{A} < 45^\circ$. Θεωρούμε τα μέσα Δ και E των πλευρών $B\Gamma$ και $A\Gamma$, αντίστοιχα, και σημείο $M \neq A$ στο ευθύγραμμο τμήμα AE . Αν η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος BM τέμνει την ευθεία ΔE στο Z και την ευθεία $A\Gamma$ στο Θ , να αποδείξετε ότι:

(α) $\hat{B}\hat{M}Z = \hat{A}$.

(β) Η ευθεία BZ διχοτομεί τη γωνία $\Theta\hat{B}E$.

Λύση

(α) Επειδή το Z ανήκει στη μεσοκάθετη του BM θα είναι $ZB = ZM$ και

$$\hat{B}\hat{M}Z = \hat{M}\hat{B}Z = \omega.$$

Επειδή είναι $\Delta E \parallel AB$ και $AB \perp B\Gamma$ έπεται ότι $\Delta E \perp B\Gamma$, δηλαδή η ευθεία ΔE είναι μεσοκάθετη της πλευράς $B\Gamma$. Αφού $Z \in B\Gamma$ θα είναι $ZB = Z\Gamma$ και

$$\hat{Z}\hat{B}\Gamma = \hat{Z}\hat{\Gamma}B = \varphi.$$

Επειδή $MZ = BZ = \Gamma Z$ θα είναι και

$$\hat{Z}\hat{M}\Gamma = \hat{Z}\hat{\Gamma}M = \theta.$$

Από το τρίγωνο $B\hat{M}\Gamma$, λόγω των προηγούμενων ισοτήτων, έχουμε

$$\hat{M}\hat{B}\Gamma + \hat{B}\hat{\Gamma}M + \hat{\Gamma}\hat{M}B = 180^\circ \Rightarrow 2\omega + 2\varphi + 2\theta = 180^\circ$$


$$\omega + \varphi + \theta = 90^\circ. \quad (1)$$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ λαμβάνουμε

$$\varphi + \theta = \hat{\Gamma} = 90^\circ - \hat{A}. \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) με αφαίρεση κατά μέλη λαμβάνουμε:

$$\hat{B}\hat{M}Z = \omega = \hat{A}.$$



Σχήμα 3

(β) Επειδή το σημείο Θ ανήκει στη μεσοκάθετη του BM η ΘZ είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{B\Theta E}$. Επίσης, επειδή η BE είναι διάμεσος του ορθογώνιου τριγώνου ABΓ προς την υποτείνουσα, θα είναι $BE = \frac{AG}{2} = EG$, οπότε το τρίγωνο BEΓ είναι ισοσκελές με την ΕΔ ύψος και διχοτόμο της γωνίας $\widehat{B\hat{E}\Gamma}$, άρα και της γωνίας $\widehat{B\hat{E}\Theta}$. Επομένως στο τρίγωνο BΘE το Z είναι το σημείο τομής των διχοτόμων του, οπότε και η BZ διχοτομεί τη γωνία $\widehat{\Theta B E}$.

Πρόβλημα 4

Αν υπάρχουν ακέραιοι x, y, a που επαληθεύουν την εξίσωση

$$yx^2 + (y^2 - a^2)x + y(y - a)^2 = 0,$$

να αποδείξετε ότι ο αριθμός xy είναι τέλειο τετράγωνο ρητού αριθμού.

Λύση

Έστω ότι οι ακέραιοι x, y, a επαληθεύουν την εξίσωση: $yx^2 + (y^2 - a^2)x + y(y - a)^2 = 0$.

Μετά τις πράξεις και αναδιάταξη των όρων η εξίσωση, ως προς άγνωστο το a , γράφεται:

$$(y - x)a^2 - 2y^2a + y(x^2 + xy + y^2) = 0.$$

Σύμφωνα με την υπόθεση, η εξίσωση αυτή με άγνωστο το a έχει ακέραια λύση, αλλά και ακέραιους συντελεστές. Επομένως, η διακρίνουσα της είναι τέλειο τετράγωνο ακεραίου, δηλαδή υπάρχει $\kappa \in \mathbb{Z}$ τέτοιο, ώστε

$$\Delta = 4y^4 - 4y(y - x)(x^2 + xy + y^2) = 4y[y^3 - (y^3 - x^3)] = 4yx^3 = xy(2x)^2 = \kappa^2.$$

Από την τελευταία ισότητα προκύπτει ότι: $xy = \left(\frac{\kappa}{2x}\right)^2$, όπου ο αριθμός $\frac{\kappa}{2x}$ είναι ρητός.